

# Diskrétna matematika I. – Domáca úloha č. 5

Cvičenia v týždni 27. októbra 2014

---

**1.** Zistite či sú nasledujúce kvantifikované formule s ľubovoľnými predikátmi  $\Phi$ ,  $\Psi$  a  $A$  tautológie. Ak sú, dokážte to, ak nie sú, nájdite protipríklad:

- a)  $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x)\Phi(x) \Rightarrow (\forall x)\Psi(x)),$
- b)  $(\forall x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x)) \Leftrightarrow ((\forall x)\Phi(x) \wedge (\forall x)\Psi(x)),$
- c)  $((\exists x)\Phi(x) \wedge (\exists x)\Psi(x)) \Rightarrow (\exists x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x)),$
- d)  $(\exists x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Leftrightarrow ((\exists x)\Phi(x) \vee (\exists x)\Psi(x)),$
- e)  $(\forall x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x)\Phi(x) \vee (\forall x)\Psi(x)),$
- f)  $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow (\exists x)\Phi(x),$
- g)  $(\exists x)(\forall y)A(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x)A(x, y),$
- h)  $(\forall y)(\exists x)A(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y)A(x, y),$
- i)  $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \Rightarrow (\forall x)A(x, x),$
- j)  $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \Rightarrow (\exists x)A(x, x).$

Pozn.  $\Phi(x)$ ,  $\Psi(x)$  a  $A(x, y)$  sú ľubovoľné predikáty, t.j. napríklad  $A$  priradí prvkom  $x, y$  nejakú pravdivostnú hodnotu. Ako príklady môžu slúžiť predikáty “ $=$ ”, “ $>$ ” a pod. Úlohou je rozhodnúť, či sú dané výroky vždy pravdivé bez ohľadu na to, čo vlastne  $\Phi$ ,  $\Psi$  alebo  $A$  znamená, resp. aké objekty reprezentujú premenné  $x$  a  $y$ .

Napríklad v 1a) môžeme zvoliť  $\Phi(x)$  = ”auto  $x$  je červené” a  $\Psi(x)$  = ”auto  $x$  má štyri kolesá”. Potom kvantifikovaný výrok  $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x)\Phi(x) \Rightarrow (\forall x)\Psi(x))$  hovorí:

”Ak pre každé auto platí: je červené  $\Rightarrow$  má štyri kolesá, potom ak sú všetky autá červené, tak majú všetky autá štyri kolesá.”

Čo síce znies pravdivo, ale nič nedokazuje. Jeden príklad totiž nedokazuje, že niečo platí vždy.

Dokázať že tento výrok je tautológia, bez ohľadu na význam predikátov  $\Phi$  a  $\Psi$ , musíme trochu inak. Treba sa pozrieť, či by tento výrok mohol byť ohodnotený nepravdivo a dôjsť k sporu.

Mali by sme totiž:

$$v((\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x))) \equiv 1, \quad \text{a} \quad v(((\forall x)\Phi(x) \Rightarrow (\forall x)\Psi(x))) \equiv 0,$$

teda

$$v((\forall x)\Phi(x)) \equiv 1 \quad \text{a} \quad v((\forall x)\Psi(x)) \equiv 0.$$

Z posledného vieme  $v((\exists x)\neg\Psi(x)) \equiv 1$ , teda pre nejaké  $x_0$  máme  $v(\Psi(x_0)) \equiv 0$ . Zároveň vieme (prečo?), že  $v(\Phi(x_0)) \equiv 1$ , a teda  $v(\Phi(x_0) \Rightarrow \Psi(x_0)) \equiv 0$ , čo je spor s  $v((\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x))) \equiv 1$ .

**2.** Hovoríme, že formula  $A$  je v *prenexnom* tvaru, ak má tvar  $(Q_1x_1)(Q_2x_2) \dots (Q_nx_n)B$ , kde každé  $Q_i$  je kvantifikátor ( $\exists$  alebo  $\forall$ ),  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sú navzájom rôzne premenné a  $B$  neobsahuje žiadne kvantifikátory. Inými slovami, vo formuli v prenexnom tvaru sú všetky kvantifikátory na jej začiatku.

V príklade 1b) sme ukázali, že formula  $(\forall x)\Phi(x) \wedge (\forall x)\Psi(x)$  je ekvivalentná formuli  $(\forall x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x))$ , ktorá je v prenexnom tvaru. (Rozmyslite si prečo).

Nájdite formule v prenexnom tvaru, ktoré sú ekvivalentné nasledujúcim formulám:

- a)  $(\forall x)\Phi(x) \vee (\forall x)\Psi(x),$
- b)  $(\exists x)\Phi(x) \wedge (\forall x)\Psi(x),$
- c)  $(\exists x)\Phi(x) \vee (\exists x)\Psi(x),$
- d)  $(\exists x)\Phi(x) \Rightarrow (\exists x)\Psi(x).$