

Diskrétna matematika I. – Domáca úloha č. 5

Pre týždeň 28. októbra 2019

Vzhľadom na rektorské voľno 31. októbra sa cvičenia uskutočnia v náhradnom termíne:
pondelok, 4. novembra 2019.

1. Zistite či sú nasledujúce kvantifikované formule s ľubovoľnými predikátmi Φ , Ψ a A tautológie. Ak sú, dokážte to, ak nie sú, nájdite protipríklad:

- $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x) \Phi(x) \Rightarrow (\forall x) \Psi(x))$,
- $(\forall x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x)) \Leftrightarrow ((\forall x) \Phi(x) \wedge (\forall x) \Psi(x))$,
- $((\exists x) \Phi(x) \wedge (\exists x) \Psi(x)) \Rightarrow (\exists x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x))$,
- $(\exists x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Leftrightarrow ((\exists x) \Phi(x) \vee (\exists x) \Psi(x))$,
- $(\forall x)(\Phi(x) \vee \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x) \Phi(x) \vee (\forall x) \Psi(x))$,
- $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow (\exists x) \Phi(x)$,
- $(\exists x)(\forall y) A(x, y) \Rightarrow (\forall y)(\exists x) A(x, y)$,
- $(\forall y)(\exists x) A(x, y) \Rightarrow (\exists x)(\forall y) A(x, y)$,
- $(\forall x)(\forall y) A(x, y) \Rightarrow (\forall x) A(x, x)$,
- $(\exists x)(\exists y) A(x, y) \Rightarrow (\exists x) A(x, x)$.

Pozn. $\Phi(x)$, $\Psi(x)$ a $A(x, y)$ sú ľubovoľné predikáty, t.j. napríklad A priradí prvkom x, y nejakú pravdivostnú hodnotu. Ako príklady môžu slúžiť predikáty “=”, “>” a pod. Úlohou je rozhodnúť, či sú dané výroky vždy pravdivé bez ohľadu na to, čo vlastne Φ , Ψ alebo A znamená, resp. aké objekty reprezentujú premenné x a y .

Napríklad v 1a) môžeme zvoliť $\Phi(x)$ = ”auto x je červené” a $\Psi(x)$ = ”auto x má štyri kolesá”. Potom kvantifikovaný výrok $(\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x)) \Rightarrow ((\forall x) \Phi(x) \Rightarrow (\forall x) \Psi(x))$ hovorí:

”Ak pre každé auto platí: je červené \Rightarrow má štyri kolesá, potom ak sú všetky autá červené, tak majú všetky autá štyri kolesá.”

Čo síce znie pravdivo, ale nič nedokazuje. Jeden príklad totiž nedokazuje, že niečo platí vždy.

Dokázať že tento výrok je tautológia, bez ohľadu na význam predikátov Φ a Ψ , musíme trochu inak. Treba sa pozrieť, či by tento výrok mohol byť ohodnotený nepravdivo a dôjsť k sporu.

Mali by sme totiž:

$$v((\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x))) \equiv 1, \quad \text{a} \quad v(((\forall x) \Phi(x) \Rightarrow (\forall x) \Psi(x))) \equiv 0,$$

teda

$$v((\forall x) \Phi(x)) \equiv 1 \quad \text{a} \quad v((\forall x) \Psi(x)) \equiv 0.$$

Z posledného vieme $v((\exists x) \neg \Psi(x)) \equiv 1$, teda pre nejaké x_0 máme $v(\Psi(x_0)) \equiv 0$. Zároveň vieme (prečo?), že $v(\Phi(x_0)) \equiv 1$, a teda $v(\Phi(x_0) \Rightarrow \Psi(x_0)) \equiv 0$, čo je spor s $v((\forall x)(\Phi(x) \Rightarrow \Psi(x))) \equiv 1$.

2. Hovoríme, že formula A je v *prenexnom* tvare, ak má tvar $(Q_1x_1)(Q_2x_2) \dots (Q_nx_n)B$, kde každé Q_i je kvantifikátor (\exists alebo \forall), x_1, x_2, \dots, x_n sú navzájom rôzne premenné a B neobsahuje žiadne kvantifikátory. Inými slovami, vo formulí v prenexnom tvare sú všetky kvantifikátory na jej začiatku.

V príklade 1b) sme ukázali, že formula $(\forall x) \Phi(x) \wedge (\forall x) \Psi(x)$ je ekvivalentná formulí $(\forall x)(\Phi(x) \wedge \Psi(x))$, ktorá je v prenexnom tvare. (Rozmyslite si prečo).

Nájdite formule v prenexnom tvare, ktoré sú ekvivalentné nasledujúcim formulám:

- $(\forall x) \Phi(x) \vee (\forall x) \Psi(x)$,
- $(\exists x) \Phi(x) \wedge (\forall x) \Psi(x)$,
- $(\exists x) \Phi(x) \vee (\exists x) \Psi(x)$,
- $(\exists x) \Phi(x) \Rightarrow (\exists x) \Psi(x)$.