

V čiastočne usporiadanej množine  $A$  s usporiadaním  $\leq$  sa prvok  $a$  nazýva *najmenší* ak  $(\forall x \in A)a \leq x$ . Prvok  $b$  sa nazýva *minimálny* ak  $(\forall x \in A)(x \leq b \Rightarrow x = b)$ . Podobne, prvok  $c$  sa nazýva *najväčší* ak  $(\forall x \in A)x \leq c$  a prvok  $d$  *maximálny* ak  $(\forall x \in A)(d \leq x \Rightarrow x = d)$ . Pojmy minimálny a najmenší označujú rôzne veci, hlavne pre množiny, ktoré sú usporiadané iba čiastočne.

1. Nájdite čiastočne usporiadanú množinu, ktorá má práve jeden maximálny prvok a nemá najväčší prvok.

2. Dokážte, že v lineárne usporiadanej množine je minimálny prvok aj najmenší.

3. Dokážte, že ak v čiastočne usporiadanej množine existuje najväčší prvok, tak je jediným maximálnym prvkom.

4. Nech  $A = \{a, b, c\}$  a  $B = \{x, y\}$ . Nájdite nasledujúce zobrazenia (ak existujú):

a) všetky injektívne z  $A$  do  $B$ , a všetky injektívne z  $B$  do  $A$ .

b) všetky surjektívne z  $A$  do  $B$ , a všetky surjektívne z  $B$  do  $A$ .

c) všetky bijektívne z  $A$  do  $B$ , a všetky bijektívne z  $B$  do  $A$ .

5. Vyplýva z toho, že zložené zobrazenie  $f \circ g$  je injektívne aj injektivita  $f$ ? Ako to je s injektivitou  $g$ ? Čo sa stane ak nahradíme v predchádzajúcich otázkach „injektivnosť“ pojmom „surjektívnosť“?

6. Nech  $A$  je konečná množina. Dokážte:

a) Ak  $f : A \rightarrow A$  je injektívne, tak je aj surjektívne.

b) Ak  $f : A \rightarrow A$  je surjektívne, tak je aj injektívne.

Platia takéto tvrdenia aj pre nekonečnú množinu (napr.  $\mathbb{N}$ )?

7. Nájdite bijekciu medzi  $\langle 0, 1 \rangle$  a  $\{[x, y] \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 1\}$ .

8. Nájdite bijekciu medzi intervalmi:  $(0, 1)$ ,  $(0, \infty)$ .

9. Množinu všetkých zobrazení z  $X$  do  $Y$  označujeme ako  $Y^X = \{f \mid f \text{ je zobrazenie z } X \text{ do } Y\}$ . Ukážte, že pre neprázdnu množinu  $A$  platí:

a)  $A^\emptyset = \{\emptyset\}$ ,

b)  $\emptyset^A = \emptyset$ ,

c)  $\emptyset^\emptyset = \{\emptyset\}$ .

*Návod:* Zobrazenie z  $A$  do  $B$ , ako relácia, t.j. podmnožina kartézskeho súčinu  $A \times B$  má spĺňať nejaké vlastnosti. Ukážte, že v prípadoch a) a c) má takéto vlastnosti prázdna množina, v prípade b) taká podmnožina neexistuje.

### Bonusové príklady

10. Nájdite bijekciu medzi intervalmi:  $(0, 1)$ ,  $(0, 1)$ .

11. Nájdite injektívne zobrazenie z  $\mathbb{R}^2$  do  $\mathbb{R}$ .