Lineárna algebra – Domáca úloha č. 9

Cvičenia v týždni 21. novembra 2016

---

1. (3.3.11) Predpokladajme, že P je projekčná matica zobrazujúca na podpriestor S a Q je projekčná matica zobrazujúca na jeho ortogonálny doplnok $S^\perp$. Čo budú $P+Q$ a PQ? Ukážte, že matica $P-Q$ je sama sebe inverznou.

2. Predpokladajme, že $n \times n$ matica P spĺňa $P^2 = P$. Ukážte, že potom $\mathcal{S}(I-P) \subseteq \mathcal{N}(P)$.
Skúste načrnúť zobrazenie dané maticou P a zdôvodniť prečo by mala platiť rovnosť $\mathcal{S}(I-P) = \mathcal{N}(P)$. (Ako by vyzeral vektor, ktorý by patril do $\mathcal{N}(P)$ a nepatril do $\mathcal{S}(I-P)$?)

3. (3.3.12) Ak V je podpriestor generovaný vektormi $(1,1,0,1)$ a $(0,0,1,0)$ nájdite
a) bázu ortogonálneho doplnku $V^\perp$,
b) projekčnú maticu P zobrazujúcu na V,
c) vektor vo V, ktorý je najbližšie k vektoru $b = (0,1,0,-1)$ z $V^\perp$.

4. (3.3.26) Mladý odborný asistent bol natiahnutý na škripci na dĺžky $L = 175, 180$ a 185 centimetrov pri aplikovaní sily zodpovedajúcej tiaži $F = 1, 2$ a 4 tony. Ak predpokladáme, že platí Hookov zákon $L = a + bF$, nájdite jeho pokojovú dĺžku a metódou najmenších štvorcov.

5. (3.4.2) Nájdite projekcie vektora $b = (0,3,0)$ na priamky dané navzájom ortogonálnymi vektormi $a_1 = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ a $a_2 = (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. Nájdite projekciu vektora b na rovinu generovanú a_1 a a_2.

6. Ukážte, že ortogonálna matica, ktorá je zároveň hornou trojuholníkovou musí byť diagonálna.

7. (3.4.4) Nech Q_1 a Q_2 sú ortogonálne matice (t.j. spĺňajú $Q^TQ = I$). Ukážte, že aj súčin Q_1Q_2 je ortogonálna matica. Ak matica Q_1 reprezentuje otočenie (v $\mathbb{R}^2$) o uhol θ a matica Q_2 otočenie o uhol ϕ, čo bude Q_1Q_2? Čo bude Q_2Q_1? Nájdite súčtové vzorce pre $\sin(\theta+\phi)$ a $\cos(\theta+\phi)$ v súčine Q_1Q_2.

8. (3.4.5) Nech u je jednotkový vektor. Ukážte, že $Q = I - 2u^Tu$ je ortogonálna matica. Táto matica reprezentuje súmernosť podľa nadroviny $\rho = \{x \,|\, a^Tx = 0\}$ a nazýva sa Householderova transformácia. Skúste si nakresliť obrázok, projekciu na priamku danú vektorom u, atď. Vypočítajte Q pre $u^T = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.

9. (3.4.6) Nájdite tretí stĺpec matice

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-3}{\sqrt{14}} & \end{bmatrix}$$

tak, aby bola ortogonálna (t.j. $Q^TQ = I$). Musí to byť vektor jednotkovej dĺžky, ortogonálny na zvyšné dva stĺpce – koľko voľnosti vlastne zostáva? Ukážte, že potom budú aj riadky matice Q ortonormálne.

10. (3.4.9) Ak sú vektory q_1, q_2 a q_3 ortonormálne, ktorá lineárna kombinácia q_1 a q_2 je nabližšie ku q_3?

11. (3.4.13) Použite Gram-Schmidtov proces na vektory

$$a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a vyjadrite výsledok v tvare $A = QR$.

12. (3.4.27) Nájdite ortonormálnu bázu pre podpriestor generovaný vektormi $a_1 = (1,-1,0,0)$, $a_2 = (0,1,-1,0)$ a $a_3 = (0,0,1,-1)$.