

Lineárna algebra a geometria II. – Domáca úloha č. 1

Cvičenia v týždni 20. februára 2012

1. (5.1.13) Ak matica B má vlastné hodnoty 1, 2, 3, matica C má vlastné hodnoty 4, 5, 6 a matica D má vlastné hodnoty 7, 8, 9, čo budú vlastné hodnoty 6×6 matice $A = [\begin{smallmatrix} B & C \\ 0 & D \end{smallmatrix}]$?

2. (5.1.16) Nech A je 4×4 matica, ktorej zložky sú samé jednotky (ako v príklade 0.3). Nájdite potom vlastné hodnoty a determinant matice $A - I$. Porovnajte tiež s príkladom 4.3.10 - DÚ č. 12, príklad 8.

3. (5.1.18) Predpokladajme, že matica A má vlastné hodnoty 0, 1, 2 a k nim vlastné vektory v_0, v_1, v_2 . Opíšte nulový priestor a stĺpcový priestor matice A . Riešte rovnica $Ax = av_1 + bv_2$. Ukážte, že rovnica $Ax = v_0$ nemá riešenie.

4. (5.2.2) Nájdite maticu A , ktorej vlastné hodnoty sú 1 a 4 a vlastné vektory k nim sú $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ a $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

5. (5.2.6) (a) Ak $A^2 = I$, aké môže mať matica A vlastné hodnoty?

(b) Ak je takáto matica typu 2×2 a nerovná sa I alebo $-I$, nájdite jej stopu a determinant.

(c) Dopočítajte druhý riadok matice, ak je jej prvý riadok $(3, -1)$.

6. (5.2.8) Predpokladajme, že $A = uv^T$, teda matica A vznikne vynásobením stĺpca riadkom (a má preto hodnosť 1).

(a) Ukážte, prenásobením matice A vektorom u , že u je jej vlastný vektor. Čo bude λ ?

(b) Aké sú ostatné vlastné hodnoty (a prečo)?

(c) Vypočítajte stopa(A) = $v^T u$ dvoma rôznymi spôsobmi – ako súčet prvkov na diagonále a ako súčet vlastných hodnôt.

7. (5.2.9) Priamym výpočtom ukážte, že AB a BA majú rovnakú stopu, keď

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad B = \begin{bmatrix} q & r \\ s & t \end{bmatrix}.$$

Odvodte z toho, že $AB - BA = I$ nemôže nastať. (Je to možné iba pre zobrazenia na nekonečne rozmerných priestoroch)

8. Nájdite vlastné hodnoty a vlastné vektory pre matice

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{a} \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

9. (5.1.17) Nájdite tretí riadok matice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$

tak, aby jej charakteristický polynóm $\det(A - \lambda I)$ bol $-\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 6$.

10. (5.2.7) Nájdite A^{100} ak $A = [\begin{smallmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}]$.

11. (5.2.11) Ak vlastné hodnoty 3×3 matice A sú 1, 1 a 2, ktoré z nasledujúcich tvrdení sú zaručene pravdivé? Zdôvodnite v pravdivom prípade, nájdite protipríklad v nepravdivom.

a) A je invertibilná,

b) A je diagonalizovateľná,

c) A nie je diagonalizovateľná.