

Úlohy (strany a číslovanie) sú z knihy Carla D. Meyera *Matrix Calculus and Applied Linear Algebra*.

1. (5.1.3) Ukážte, že $(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)^2 \leq n(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2)$ pre $\alpha_i \in \mathbb{R}$.
2. (5.1.5) Ak $x, y \in \mathbb{R}^n$ spĺňajú $\|x + y\|_2 = \|x - y\|_2$, čo sa dá povedať o $x^T y$?
3. (5.1.7) Ukážte, že každá vektorová norma na \mathbb{C}^n závisí spojitou od zložiek vektora, t.j. pre každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ také, že $\| \|x\| - \|y\| \| < \varepsilon$ ak $|x_i - y_i| < \delta$ pre každé i .
4. (5.1.8) a) Ukážte, že pre $x \in \mathbb{C}^n$ platí $\|x\|_1 \geq \|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$.
b) Ukážte, že pre $x \in \mathbb{C}^n$ platí $\|x\|_i \geq \alpha \|x\|_j$, kde α je (i, j) -ta zložka matice:

$$\begin{pmatrix} * & \sqrt{n} & n \\ 1 & * & \sqrt{n} \\ 1 & 1 & * \end{pmatrix}.$$

5. (5.1.11) Použite Hölderovu nerovnosť na dôkaz toho, že ak súčet zložiek vektora $x \in \mathbb{R}^n$ je nulový (t.j. $x^T e = 0$ pre $e^T = (1, 1, \dots, 1)$), potom

$$|x^T y| \leq \|x\|_1 \left(\frac{y_{\max} - y_{\min}}{2} \right) \quad \text{pre všetky } y \in \mathbb{R}^n.$$

6. (5.2.3) a) Vysvetlite prečo $\|I\| = 1$ pre každú indukovanú maticovú normu.
b) Aká je hodnota $\|I_{n \times n}\|_F$?
7. (5.2.6) Ukážte, že pre maticovú 2-normu (indukovanú euklidovskou vektorovou normou) platí
 - a) $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \max_{\|y\|_2=1} |y^* Ax|$,
 - b) $\|A\|_2 = \|A^*\|_2$,
 - c) $\|A^* A\|_2 = \|A\|_2^2$,
 - d) $\| \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \|_2 = \max \{ \|A\|_2, \|B\|_2 \}$,
 - e) $\|U^* A V\|_2 = \|A\|_2$, ak $U U^* = I$ a $V^* V = I$.

8. (5.2.7) Ukážte, že pre regulárnu maticu A indukovaná norma spĺňa

$$\|A\| = \frac{1}{\min_{\|x\|=1} \|A^{-1}x\|}, \quad \text{čo je ekvivalentné} \quad \|A^{-1}\| = \frac{1}{\min_{\|x\|=1} \|Ax\|}.$$

9. (5.2.8) Pre $A \in M_{n,n}(\mathbb{C})$ a parameter $z \in \mathbb{C}$ sa matica $R(z) = (zI - A)^{-1}$ nazýva *rezolventa* A . Ukážte, že ak $|z| > \|A\|$ pre ľubovoľnú indukovanú maticovú normu, potom

$$\|R(z)\| \leq \frac{1}{|z| - \|A\|}.$$

10. (5.9.8) Ukážte, že $\|P\|_2 \geq 1$ pre každý projekčný operátor $P \neq 0$. Kedy platí rovnosť $\|P\|_2 = 1$?
11. (5.9.9) Vysvetlite prečo platí $\|I - P\|_2 = \|P\|_2$ pre všetky projektory, ktoré sú nenulové a nerovnejú sa identite.
12. (5.9.10) Ukážte, že pre $u, v \in \mathbb{R}^n$ spĺňajúce $v^T u = 1$ platí:

$$\|I - uv^T\|_2 = \|uv^T\|_2 = \|u\|_2 \|v\|_2 = \|uv^T\|_F.$$