

Maticový počet – Úloha č. 0

Cvičenia v týždni 23. septembra 2019

Úlohy (strany a číslenie) sú z knihy Carla D. Meyera *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*.

1. (1.2.15) Overte, že počet operácií v Gaussovej eliminácii so spätnou substitúciou pre $n \times n$ maticu zodpovedá údajom uvedeným v texte, t.j. násobení/delení je $\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}$ a sčítanie/odčítanie je $\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$.

2. (rovnosť 3.8.1, str. 124) Overte, že ak $v^T u \neq 1$, potom

$$(I - uv^T)^{-1} = I - \frac{uv^T}{v^T u - 1}.$$

3. (2.1.5) Koľko rôznych “tvarov” existuje pre 3×4 matice, ktoré sú v stupňovitom tvare?

4. (2.3.4) Uvažujme dva konzistentné systémy, ktorých rozšírené matice sú $(A|b)$ a $(A|c)$, t.j. líšia sa v pravej strane. Je systém reprezentovaný $(A|b+c)$ konzistentný? Vysvetlite prečo.

5. (2.3.8) Predpokladajme, že rozšírená matica systému $(A|b)$ sa dá zredukovať pomocou Gaussovej eliminácie na stupňovitý tvar $(E|c)$. Ak sa v $(E|c)$ nenachádza riadok tvaru

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & | & \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha \neq 0$$

je možné, že sa riadok takého tvaru objavil počas skorších štádií eliminácie? Prečo?

Inými slovami: môže sa v systéme objaviť nekonzistencia a nejak sa pokračujúcou elimináciou vytratiť?