

Úlohy (strany a číslovanie) sú z knihy Carla D. Meyera *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*.

1. (5.3.4) Ukážte, že v reálnom vektorovom priestore so skalárnym súčinom a normou  $\|\cdot\|^2 = \langle \cdot | \cdot \rangle$  platí nerovnosť

$$\langle x | y \rangle \leq \frac{\|x\|^2 + \|y\|^2}{2}.$$

*Návod:* Uvažujte  $x - y$ .

2. (5.3.5) Zôvodnite prečo pre  $n \times n$  matice  $A$  a  $B$  platia nasledujúce nerovnosti:

- $|\operatorname{Tr}(B)|^2 \leq n(\operatorname{Tr}(B^*B))$ .
- $\operatorname{Tr}(B^2) \leq \operatorname{Tr}(B^T B)$  pre reálne matice.
- $\operatorname{Tr}(A^T B) \leq \frac{\operatorname{Tr}(A^T A) + \operatorname{Tr}(B^T B)}{2}$  pre reálne matice.

3. (5.3.6) Pozrite si dôkaz rovnobežníkovej rovnosti na str. 290 a rozšírte ho na komplexné vektorové priestory.

*Návod:* Ak je v komplexnom vektorovom priestore  $V$  s normou  $\|\cdot\|$  splnená rovnobežníková identita, zvolte

$$\langle x | y \rangle_r = \frac{\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2}{4}$$

a ukážte, že

$$\langle x | y \rangle = \langle x | y \rangle_r + i \langle ix | y \rangle_r \quad (\text{polarizačná identita})$$

definuje hermitovský skalárny súčin na  $V$ .

4. (5.3.8) Vysvetlite prečo Frobeniova maticová norma spĺňa rovnobežníkovú identitu na  $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ .

5. (5.6.7) Predpokladajme, že  $R$  a  $S$  sú matice elementárnych reflexií.

- Je  $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$  elementárna reflexia?
- Je  $\begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$  elementárna reflexia?

6. (5.6.9) Nech  $U_{m \times r}$  je matica s ortonormálnymi stĺpcami a  $V_{k \times n}$  je matica s ortonormálnymi riadkami. Pre ľubovoľnú maticu  $A \in M_{r \times k}(\mathbb{C})$  riešte nasledujúce úlohy pre maticové 2-normy a Frobeniove maticové normy:

- Nájdite hodnoty  $\|U\|_2$ ,  $\|V\|_2$ ,  $\|U\|_F$  a  $\|V\|_F$ .
- Ukážte, že  $\|UAV\|_2 = \|A\|_2$ . (*Návod:* Začinite s  $\|UA\|_2$ .)
- Ukážte, že  $\|UAV\|_F = \|A\|_F$ .

*Pozn.* Tieto vlastnosti noriem platia aj v špeciálnom prípade, keď sú matice  $U$  a  $V$  unitárne (štvorcové). Preto sú 2-norma a  $F$ -norma tzv. *unitárne invariantné maticové normy*.

7. (5.6.14) Nech  $R = I - 2uu^*$ , kde  $u \in \mathbb{R}^n$  s  $\|u\| = 1$ . Ukážte výpočtom, že ak je  $x$  fixným bodom reflexie  $R$  (t.j.  $Rx = x$ ), tak  $x$  musí byť kolmý na  $u$ .

8. (5.6.15) Nech pre  $x, y \in \mathbb{R}^n$  platí  $\|x\| = \|y\|$ , ale  $x \neq y$ . Vysvetlite ako sa dá skonštruovať elementárna reflexia  $R$  spĺňajúca  $Rx = y$ .

*Návod:* Pozrite si obrázok 5.6.2 na str. 324 a nájdite vyjadrenie pre vhodný vektor  $u$  definujúci reflexiu  $R$ .

9. (5.6.16) Nech  $x \in \mathbb{R}^n$ , resp.  $\mathbb{C}^n$ , spĺňa  $\|x\| = 1$ . Uvažujme jeho delenie

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \tilde{x} \end{pmatrix}, \quad \text{kde } \tilde{x} \in \mathbb{R}^{n-1}, \text{ resp. } \mathbb{C}^{n-1}.$$

a) Ukážte, že ak sú zložky  $x$  reálne a  $x_1 \neq 1$ , potom je

$$P = \begin{pmatrix} x_1 & \tilde{x}^T \\ \tilde{x} & I - \alpha \tilde{x} \tilde{x}^T \end{pmatrix} \quad \text{pre} \quad \alpha = \frac{1}{1 - x_1}$$

ortogonálna matica.

b) Ukážte, že ak sú zložky  $x$  komplexné,  $|x_1| \neq 1$  a  $\mu = \frac{x_1}{\|x_1\|}$ , potom je

$$U = \begin{pmatrix} x_1 & \mu^2 \tilde{x}^* \\ \tilde{x} & \mu(I - \alpha \tilde{x} \tilde{x}^*) \end{pmatrix} \quad \text{pre} \quad \alpha = \frac{1}{1 - \|x_1\|}$$

unitárna matica.

*Pozn.* Tieto výsledky umožňujú pomerne jednoduché rozšírenie daného jednotkového vektora  $x$  na ortonormálnu bázu  $\mathbb{R}^n$ , resp.  $\mathbb{C}^n$ .

**10.** (5.7.2) Predpokladajme, že  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  má hodnotu  $h(A) = n$  a  $P$  je ortogonálna matica spĺňajúca

$$PA = T = \begin{pmatrix} R_{n \times n} \\ 0 \end{pmatrix},$$

pričom  $R$  je horná trojuholníková matica. Ukážte, že ak  $P^T$  je rozdelená na bloky

$$P^T = (X_{m \times n} | Y),$$

potom stĺpce matice  $X$  tvoria ortonormálnu bázu  $\mathcal{R}(A)$  a  $A = XR$  je  $QR$  rozklad matice  $A$ .

**11.** (5.7.5) Ukážte, že ak  $A = QR$  je  $QR$ -rozkladom matice  $A$ , potom pre Frobeniovu normu platí  $\|A\|_F = \|R\|_F$ .