

## Cvičenie 9

Na tomto cviku sa budeme zaoberať aj dosadením do polynómu a Hornerovou schémou. Tieto veci na prednáške ešte neboli, vysvetlíme si ich na cvičení, ale môžete si ich pozrieť aj vo verzii textu k prednáške, ktorý je momentálne na webe.

### Okruhy, ideály

- Zistite, či dané ideály v okruhu  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}\}$  (s obvyklým sčítaním a násobením komplexných čísel) sú maximálne ideály/prvoideály.
  - $(1 + i) = \{(1 + i)z; z \in \mathbb{C}\}$
  - $(2) = \{2z; z \in \mathbb{C}\}$
  - $(2 + i) = \{(2 + i)z; z \in \mathbb{C}\}$
- Ak  $I_1, I_2$  sú ideály v okruhu  $(R, +, \cdot)$ , tak aj
  - $I_1 + I_2 = \{a + b; a \in I_1, b \in I_2\}$  je ideál v  $R$ .
  - $I_1 \cdot I_2 = \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n; n \in \mathbb{N}, a_i, b_i \in R\}$  je ideál v  $R$ .
- Nech  $(G, *)$  je cyklická grupa,  $a$  je jej generátor, t.j.  $G = [a]$ . Ak definujeme operáciu  $\cdot$  ako  $a^k \cdot a^l = a^{k \cdot l}$  (pre ľubovoľné  $k, l \in \mathbb{Z}$ ), tak  $(G, *, \cdot)$  je okruh. Viete povedať (v závislosti od rádu generátora  $a$ ) s akým okruhom je tento okruh izomorfný?
- Dokážte, že ak  $R'$  je komutatívny okruh s jednotkou,  $R$  je nejaký jeho podokruh, ktorý obsahuje jednotku, a  $x \notin R'$ . Dokážte, že najmenší podokruh okruhu  $R'$  obsahujúci  $R \cup \{x\}$  pozostáva práve z prvkov tvaru  $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ , kde  $a_i \in R$ .

### Okruhy polynómov

- Dokážte, že zvyšok polynómu  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in F[x]$  po delení  $x - b$  je práve  $f(b)$  (=jeho hodnota v bode  $b \in F[x]$ ).
- Vydeľte dané polynómy so zvyškom v  $\mathbb{C}[x]$ .
  - $f(x) = x^4 + 3x^3 - 4x + 2, g(x) = x^2 + x - 2$
  - $f(x) = x^5 + 2x^3 + 3x + 4, g(x) = x^3 + x + 1$
  - $f(x) = x^3 + (2 + 2i)x^2 + 3ix + 1, g(x) = x^2 + (2 + i)x + i$
- Použitím Hornerovej schémy<sup>1</sup> zistite, či  $c$  je koreň polynómu  $f(x) \in \mathbb{C}[x]$  a vyjadrite tento polynóm v tvare  $f(x) = g(x)(x - c) + f(c)$ .
  - $f(x) = x^4 + 3x^3 - 4x + 2, c = -2$
  - $f(x) = x^5 + 2x^3 + 3x + 4, c = -1$
  - $f(x) = x^3 + (2 + 2i)x^2 + 3ix + 1, c = -i$
- Pomocou Hornerovej schémy vyjadriť:
  - $f(x + 3)$  pre  $f(x) = x^4 - x^3 + 1$
  - $(x - 2)^4 + 4(x - 2)^3 + 6(x - 2)^2 + 10(x - 2) + 20$
- \* Dokážte, že ak  $c = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$  je koreň polynómu  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$  s celočíselnými koeficientami, tak  $p \mid a_0$  a  $q \mid a_n$ .

---

<sup>1</sup>Pozri text k prednáške.

6. Nájdiť všetky racionálne korene daných polynómov (s pomocou Hornerovej schémy a tvrdenia dokázaného v predchádzajúcej úlohe)

a)  $f(x) = 4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$

b)  $f(x) = 24x^5 + 10x^4 - x^3 - 19x^2 - 5x + 6$

c)  $f(x) = 6x^4 + 19x^3 - 7x^2 - 26x + 12$